

くすりのしおり

内服剤

2020年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「NPI」

主成分：モサプリドクエン酸塩水和物 (Mosapride citrate hydrate)

剤形：白色の割線入り錠剤、長径 9.1mm、短径 4.6mm、厚さ 3.6mm

シート記載：（表）モサプリドクエン酸塩 5mg 「NPI」、5、消化器管用薬
（裏）Mosapride 5mg、モサプリドクエン酸塩「NPI」、消化器管用薬、NPI 5



この薬の作用と効果について

消化管のセロトニン受容体を刺激し、アセチルコリン遊離を増大することによって、上部（胃・十二指腸）および下部（大腸）消化管運動をよくし、機能を改善します。

通常、慢性胃炎に伴う胸やけ、吐き気・嘔吐の治療、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X 線造影検査前処置の補助に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・慢性胃炎に伴う胸やけ、吐き気・嘔吐：通常、成人は1回1錠（モサプリドクエン酸塩として5mg）を1日3回食前または食後に服用します。
経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X 線造影検査前処置の補助：通常、成人は、経口腸管洗浄剤の服用開始時に4錠（モサプリドクエン酸塩として20mg）を経口腸管洗浄剤（約180mL）で服用します。また経口腸管洗浄剤服用終了後、4錠（20mg）を少量の水で服用します。
いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・慢性胃炎に伴う胸やけ、吐き気・嘔吐で服用中に、飲み忘れた場合は、飲み忘れに気がついた時、すぐに飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は飲まないで、その後は指示された時間から飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢・軟便、口渇、腹痛、けん怠感、発疹、じん麻疹、吐き気、腹部膨満感、頭痛などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・全身倦怠感、食欲不振、皮膚や結膜などの黄染 [劇症肝炎、肝機能障害、黄疸]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。