


マグコロール散 50g の溶かし方と飲み方

溶かし方



①大きめのコップに約150mLの水を入れてください。(全量約180mL)

②スプーンで、かき混ぜながらくすりを全部入れて、十分に溶かしてください。

* 溶解する水の量が少なすぎると十分に溶けません。

* くすりを水に入れたら直ちに溶かしてください。

時間がたつと十分に溶けなくなります。

* 氷片を2～3個入れて冷たくしますと、飲みやすくなります。

飲み方



1口ずつ時間をかけて服用してください。

* ご高齢の方や胃の切除をされたことのある方は、特にゆっくり服用してください。

☆服用後、2～10時間後に最初の排便が起こります。

(排便は個人差があります。)

☆その後、水のような便が数回排泄されます。

来院途中で便意を催さないように十分に排便しておいてください。

☆排便量が少なかったり、水のような便にならなかった場合には、来院後、受付担当者に申し出てください。



注 意

(1) ガンコな便秘あるいは2～3日排便のない方は服用しないで連絡してください。

(2) 服用中あるいは服用後に次の症状があらわれた場合には、服用を止めすぐに連絡してください。

1. 気分が悪い 2. 吐き気がする 3. 吐いた 4. お腹が痛い

5. めまいがする 6. 顔が青ざめる 7. 寒気がする

8. じんましんが出る 9. 息苦しい 10. 意識がぼんやりする

11. 手足に力が入らない 12. 皮ふが赤くなる

13. 脈がおそくなる 14. 血の混ざった便

(3) マグコロール散を服用してから翌朝になっても排便がない場合にも、連絡してください。