


# マグコロール散 100g の溶かし方と飲み方

## 溶かし方



- ①パウチの折り目を伸ばし、底のマチを広げます。
- ②キャップを開け、500の目盛（約500mL）まで水を入れ、速やかにキャップを閉め、左右によく振って粉末を十分に溶かしてください。  
\*水を入れたまま振らずに置いておくと、溶けなくなり白濁する場合があります。
- ③1800の目盛（約1800mL）になるまで水を追加し、混ぜてください。  
\*平らな所に置いて1800の目盛まで水が入っていることを確認してください。

## 飲み方

○コップ1杯（約200mL）ずつゆっくり飲んでください。

\*特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。

（途中で便意を催した時は、排便し、引き続き全部飲んでください。）

☆飲み始めて30分から1時間後に最初の排便が起こります。

☆その後数回（5～8回）にわたって液状の排便があります。

☆排便回数とともに便の状態は固形→泥状便→黄色の水様便に変化していきます。にごりがなく、うすい黄色（尿の色くらい）になったら腸の中はきれいになっています。

☆もし全量飲まれてもうすい黄色の液にならなかった場合は、検査の前に申し出るようにしてください。



## 注意

- (1) ガンコな便秘あるいは2～3日排便のない方は服用しないで連絡してください。
- (2) 服用中あるいは服用後に次の症状があらわれた場合には、服用を止めすぐに連絡してください。
  1. 気分が悪い
  2. 吐き気がする
  3. 吐いた
  4. お腹が痛い
  5. めまいがする
  6. 顔が青ざめる
  7. 寒気がする
  8. じんましんが出る
  9. 息苦しい
  10. 意識がぼんやりする
  11. 手足に力が入らない
  12. 皮ふが赤くなる
  13. 脈がおそくなる
  14. 血の混ざった便
- (3) マグコロール散を服用して排便がない場合にも、連絡してください。