検査時の注意について



【検査前の注意】

- ◎ 現在、服用している薬があれば申し出てください。
- ◎ 検査前日の食事・下剤の服用については必ず指示通りにしてください。 そうしないと良い検査はできません。
- ◎ 平素、便秘気味の方は検査の3~4日前から下剤を服用し、毎日排便 するようにしてください。
- 下痢になりますが、下剤のためですから心配はありません。検査が始まるまでにできるだけ排便してから検査を受けてください。
- ◎ 以前に緑内障、心臓病、前立腺肥大といわれたことのある方は、検査 前にあらかじめ申し出てください。
- ご高齢の方、検査当日ふらふらする方は、できるだけ付添いの方と 来院してください。

【検査後の注意】

- ◎ 検査終了後、お腹が張ったり、痛みのある方は、右を下にして横になったり、腹ばいになったりして空気を出してください。
- ◎ 検査の前にした腸の運動を止める注射のため、人により眼がチラチラ したり、喉が渇いたりすることがありますが、まもなく治ります。
- ◎ 検査を楽にするために軽い鎮静剤を注射することがあります。検査後 30分程休んでからお帰りください。
- ◎ 検査直後は車の運転はできませんので、車での来院は避けてください。
- ◎ 帰宅後、何かございましたら当院へご連絡ください。


大腸内視鏡検査を受けられる患者さんへ

── マグコロール散を服用される前に、このパンフレットをよくお読みください。 ──

- ★当日は検査の30分前までにおいでください。受付にこの用紙と診察券をお出しください。
- ★当日は多少お待たせすることもありますから、時間に余裕をみておいでください。


◎検査について

この検査は、肛門から内視鏡を挿入して大腸の内腔を直接観察し、大腸の炎症性の病気(腸のただれ・きず)、大腸のポリープ、その他を診断する検査です。 検査は $20 \sim 30$ 分位で終わります。



◎検査前の準備について

大腸内をからっぽにして、検査を行ないます。 図のように、大腸の中に食物の残渣(便)が残っていると、検査のさまたげになり、検査が受けられなかったり、正確な診断が得られないことがあります。 そのようなことがないように、このパンフレットの指示を守り、検査にご協力ください。



- 〇ご家族の方などがおられるところでマグコロール散を服用してください。
- 〇検査3日前からの排便状況をチェックし、マグコロール散の服用前日または当日に排便 のない方はあらかじめ医師または看護師に連絡してください。

病院

連絡先 TEL

※ご都合により、検査が受けられない場合は早めに電話でご連絡ください。

正確な良い診断が受けられるように、準備を確実に行い検査にご協力ください。 指示どおり準備を行い、チェック欄に、/印をつけてください。

			ご 準 備	チェック
朝	食	Mary Control of the C	朝食用エニマクリン(鯛がゆ)を召し上がりください。	
昼	食		昼食用エニマクリン (和風ハンバーグ・白がゆ) を召し上がりください。	
間	食	**	夕食までの空腹時に、間食用エニマクリン(ゼリーミール・ビスコ)をご自由に召し上がりください。 ※水分はこれ以外にもできるだけたくさんとってください。	
タ	食	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	夕食用エニマクリン (コーンポタージュ) を召し 上がりください。	
			水薬をコップ1杯(200mL)以上の水に入れて飲んでください。	
朝 <u>絶</u>	食 食			
午前	時	772018 has 106	マグコロール散 100g に水を入れて溶かして飲んでください。 (1袋に水を入れて溶かし、1800mL にして飲んでください。)	
_	昼 間 夕 就 (全 食 食 食 食 食 前時食食	朝 食 食 食 (午後10時) 朝 食 飲 (午後10時) 朝 絶 食	朝食 さい。 昼食用エニマクリン (和風ハンバーグ・白がゆ)を召し上がりください。 夕食までの空腹時に、間食用エニマクリン (ゼリーミール・ビスコ)をご自由に召し上がりください。 ※水分はこれ以外にもできるだけたくさんとってください。 夕食用エニマクリン (コーンポタージュ)を召し上がりください。 就寝前(午後10時) 水薬をコップ1杯(200mL)以上の水に入れて飲んでください。 朝食 喉がかわいたり、空腹感があれば、水分はとっていただいてもかまいません。 マグコロール散100gに水を入れて溶かして飲んでください。(1袋に水を入れて溶かし、1800mLにして飲んでください。

検査3日前から繊維の多いもの、消化の悪いものは避けてください。

例 海藻類、きのこ類、繊維の多い野菜、種のある果物、その他(ごま、ピーナッツ、こんにゃく) ◎空腹の場合は、準備表の時間に関係なく、水分をできるだけたくさん飲んでください。





マグコロール散を飲む前に、排便状態を確認してください。

検査3日前から排便の状態を記入してください。

◎水様便、軟便 ○普通便(バナナタイプ) △硬便(コロコロタイプ)・少なかった × 出なかった

検 査 3 日 前 ⁷ (月 日)	検 査 2 日 前 (月 日)	検査前日(就寝前まで) (月日)	検査前日就寝後〜当 日 朝 (月 日)


※マグコロール散の服用前日または当日に排便のない方は、マグコロール散を服用しないで 医師または看護師に連絡し、指示に従ってください。

マグコロール散の溶かし方・飲み方

水を入れるときは容器の底を十分広げてください。











①キャップを開け、約 500mL (500 の目盛) の水を入れ てください。 ②キャップを閉め、左右に よく振って粉末を十分に 溶かしてください。 ③全量が 1800mL (1800 の目盛) になるまで水を追加してく ださい。

平らな所に置いて 1800 の 目盛まで水が入っていることを確認してください。



コップ1杯(約200mL程度)ずつゆっくり飲んでください。 *特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。

- ①服用中に次の症状があらわれた場合には、服用を止め医師または看護師にすぐに連絡 してください。
 - 1. 気分が悪い 2. 吐き気がする 3. 吐いた 4. お腹が痛い
 - 5. めまいがする 6. 顔が青ざめる 7. 寒気がする 8. じんましんが出る
 - 9. 息苦しい 10. 意識がぼんやりする 11. 手足に力が入らない
 - 12. 皮ふが赤くなる 13. 脈がおそくなる 14. 血が混ざった便
- ②服用後に同様の症状があらわれた場合にも、すぐに連絡してください。
- ③マグコロール散を服用してから1時間たっても排便がない場合にも、 連絡してください。



- ※下剤服用後、水のような便が数回排泄されます。来院途中で便意を催さないように十分に 排便しておいてください。
- ※排便量が少なかったり、水のような便にならなかった場合には、来院後、受付担当者に申し出てください。

正確な良い診断が受けられるように、準備を確実に行い検査にご協力ください。 指示どおり準備を行い、チェック欄に、/印をつけてください。

Ħ	寺 間			~" —	準	備		チェック
 	朝	食	EFFORM	朝食用 e コロンださい。	(鶏と卵の)雑炊)を召	し上がりく	
検査前日(昼	食		昼食用 e コロン んかけ・白がゆ)				
/	タ	食	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	夕食用 e コロン 召し上がりくださ	·/····	ヽンバーグ・	白がゆ)を	
	就 寝 (午後10			水薬をコップ 1 ホ でください。	不(200mL)	以上の水に	入れて飲ん	
検査当	朝		喉がかわい かまいませ	たり、空腹感があん。	れば、水分	分はとってい	ただいても	
日 (/)	午前	時	P32548 8 = 135g	マグコロール散 1 ください。 (1袋に水を入れ ください。) この時間以降は、	て溶かし、	、1800mL に		

検査3日前から繊維の多いもの、消化の悪いものは避けてください。

- 例 海藻類、きのこ類、繊維の多い野菜、種のある果物、その他 (ごま、ピーナッツ、こんにゃく)
 - ◎空腹の場合は、準備表の時間に関係なく、水分をできるだけたくさん飲んでください。





マグコロール散を飲む前に、排便状態を確認してください。

検査3日前から排便の状態を記入してください。

◎水様便、軟便 ○普通便(バナナタイプ) △硬便(コロコロタイプ)・少なかった × 出なかった

検	査	3		前	検	査			前	検査前			検査前日就寝後~当 日	朝
	(月 ——	日)			(月	日)		(月 ———	日)	(月	日)


※マグコロール散の服用前日または当日に排便のない方は、マグコロール散を服用しないで 医師または看護師に連絡し、指示に従ってください。

マグコロール散の溶かし方・飲み方

水を入れるときは容器の底を十分広げてください。











①キャップを開け、約500mL (500の目盛)の水を入れてください。 ②キャップを閉め、左右に よく振って粉末を十分に 溶かしてください。 ③全量が 1800mL (1800 の目盛) になるまで水を追加してく ださい。

平らな所に置いて 1800 の 目盛まで水が入っているこ とを確認してください。



コップ 1 杯(約 200mL 程度)ずつゆっくり飲んでください。 *特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。

- ①服用中に次の症状があらわれた場合には、服用を止め医師または看護師にすぐに連絡 してください。
 - 1. 気分が悪い 2. 吐き気がする 3. 吐いた 4. お腹が痛い
 - 5. めまいがする 6. 顔が青ざめる 7. 寒気がする 8. じんましんが出る
 - 9. 息苦しい 10. 意識がぼんやりする 11. 手足に力が入らない
 - 12. 皮ふが赤くなる 13. 脈がおそくなる 14. 血が混ざった便
- ②服用後に同様の症状があらわれた場合にも、すぐに連絡してください。
- ③マグコロール散を服用してから1時間たっても排便がない場合にも、 連絡してください。



- ※下剤服用後、水のような便が数回排泄されます。来院途中で便意を催さないように十分に 排便しておいてください。
- ※排便量が少なかったり、水のような便にならなかった場合には、来院後、受付担当者に申し出てください。

正確な良い診断が受けられるように、準備を確実に行い検査にご協力ください。 指示どおり準備を行い、チェック欄に、/印をつけてください。

Ħ	寺 間	ij		٣,	準	備		チェック
検索	朝	食	SCHOOL STATE OF THE STATE OF TH	朝食用エニマ		(鶏と卵の雑炊)	を召し	
検査前日(昼	食		昼食用エニマスコ)を召し_		(ゼリーミール 2 らい。	2個・ビ	
/	タ	食	Save and the save	夕食用エニマがゆ)を召し_		(煮込みハンバ- い。	ーグ・白	
)	就 寝 (午後1			水薬をコップ でください。	1杯(200mL)以上の水に入れ	って飲ん	
検査当日	朝 <u>絶</u>	食 食			ぶあれば、水	分はとっていただ	だいても	
日 (/)	午前	時	77000 8 mm 10g	ください。	へれて溶かし	を入れて溶かして 、1800mL にして いでください <u>。</u>		

検査3日前から繊維の多いもの、消化の悪いものは避けてください。

- 例 海藻類、きのこ類、繊維の多い野菜、種のある果物、その他 (ごま、ピーナッツ、こんにゃく)
 - ◎空腹の場合は、準備表の時間に関係なく、水分をできるだけたくさん飲んでください。





マグコロール散を飲む前に、排便状態を確認してください。

検査3目前から排便の状態を記入してください。

◎水様便、軟便 ○普通便 (バナナタイプ) △硬便 (コロコロタイプ)・少なかった × 出なかった

検	査	3	日	前	検	査	2	日	前	検査前	日 (就寝前	まで)	検査前日就寝	後~当	í 日	朝
	(月	日))		(月	日)		(月	E)		(月	日)


※マグコロール散の服用前日または当日に排便のない方は、マグコロール散を服用しないで 医師または看護師に連絡し、指示に従ってください。

マグコロール散の溶かし方・飲み方

水を入れるときは容器の底を十分広げてください。











①キャップを開け、約500mL (500の目盛)の水を入れてください。 ②キャップを閉め、左右に よく振って粉末を十分に 溶かしてください。 ③全量が 1800mL(1800 の目盛) になるまで水を追加してく ださい。

平らな所に置いて 1800 の 目盛まで水が入っていることを確認してください。



コップ1杯(約200mL程度)ずつゆっくり飲んでください。 *特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。

- ①服用中に次の症状があらわれた場合には、服用を止め医師または看護師にすぐに連絡してください。
 - 1. 気分が悪い 2. 吐き気がする 3. 吐いた 4. お腹が痛い
 - 5. めまいがする 6. 顔が青ざめる 7. 寒気がする 8. じんましんが出る
 - 9. 息苦しい 10. 意識がぼんやりする 11. 手足に力が入らない
 - 12. 皮ふが赤くなる 13. 脈がおそくなる 14. 血が混ざった便
- ②服用後に同様の症状があらわれた場合にも、すぐに連絡してください。
- ③マグコロール散を服用してから1時間たっても排便がない場合にも、 連絡してください。



- ※下剤服用後、水のような便が数回排泄されます。来院途中で便意を催さないように十分に 排便しておいてください。
- ※排便量が少なかったり、水のような便にならなかった場合には、来院後、受付担当者に申し出てください。

正確な良い診断が受けられるように、準備を確実に行い検査にご協力ください。 指示どおり準備を行い、チェック欄に、/印をつけてください。

F	寺 間			<u></u>	準	備	チェック
 検 ***	朝	食		沿し上がりくださ いものをおとり [、]	o .		
査前日	昼	食	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	昼食用コロミル んかけ・白がゆ	***	ごゃがいもの鶏そい がりください。	ぼろあ
	タ	食	(BANN-7)	夕食用コロミル 召し上がりくだ		ヘンバーグ・白がり	ゆ)を
	就 寝 (午後10			水薬をコップ 1 でください。	杯 (200mL)) 以上の水に入れ	て飲ん
検査	朝	食 食	喉がかわい かまいませ		あれば、水	分はとっていただ	いても
当日(/)	午前	時	772054 B as 10g	ください。	れて溶かし	を入れて溶かしてf 、1800mL にしてf いでください。	

検査3日前から繊維の多いもの、消化の悪いものは避けてください。

- 例 海藻類、きのこ類、繊維の多い野菜、種のある果物、その他 (ごま、ピーナッツ、こんにゃく)
 - ◎空腹の場合は、準備表の時間に関係なく、水分をできるだけたくさん飲んでください。





マグコロール散を飲む前に、排便状態を確認してください。

検査3日前から排便の状態を記入してください。

◎水様便、軟便 ○普通便(バナナタイプ) △硬便(コロコロタイプ)・少なかった × 出なかった

検	査	3		前	検	査			前	検査前			検査前日就寝後~当 日	朝
	(月 ——	日)			(月	日)		(月 ———	日)	(月	日)


※マグコロール散の服用前日または当日に排便のない方は、マグコロール散を服用しないで 医師または看護師に連絡し、指示に従ってください。

マグコロール散の溶かし方・飲み方

水を入れるときは容器の底を十分広げてください。











①キャップを開け、約500mL (500の目盛)の水を入れてください。 ②キャップを閉め、左右に よく振って粉末を十分に 溶かしてください。 ③全量が 1800mL(1800 の目盛) になるまで水を追加してく ださい。

平らな所に置いて 1800 の 目盛まで水が入っているこ とを確認してください。



コップ1杯(約 200mL 程度)ずつゆっくり飲んでください。 *特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。

- ①服用中に次の症状があらわれた場合には、服用を止め医師または看護師にすぐに連絡 してください。
 - 1. 気分が悪い 2. 吐き気がする 3. 吐いた 4. お腹が痛い
 - 5. めまいがする 6. 顔が青ざめる 7. 寒気がする 8. じんましんが出る
 - 9. 息苦しい 10. 意識がぼんやりする 11. 手足に力が入らない
 - 12. 皮ふが赤くなる 13. 脈がおそくなる 14. 血が混ざった便
- ②服用後に同様の症状があらわれた場合にも、すぐに連絡してください。
- ③マグコロール散を服用してから1時間たっても排便がない場合にも、 連絡してください。



- ※下剤服用後、水のような便が数回排泄されます。来院途中で便意を催さないように十分に 排便しておいてください。
- ※排便量が少なかったり、水のような便にならなかった場合には、来院後、受付担当者に申し出てください。

正確な良い診断が受けられるように、準備を確実に行い検査にご協力ください。 指示どおり準備を行い、チェック欄に、/印をつけてください。

F	寺 間		ご 準 備	チェック							
検	朝食	-	通常通り召し上がりください。 (消化のよいものをおとりください。)								
査 前 日	昼食		昼食用エニマクリンCS(ゼリーミール2個・ビスコ)を召し上がりください。								
	夕食		夕食用エニマクリンCS(煮込みハンバーグ・白がゆ)を召し上がりください。								
<u> </u>	就 寝 前 (午後10時	1 1 1 0	水薬をコップ 1 杯 (200mL) 以上の水に入れて飲んでください。								
検査	朝 食		いたり、空腹感があれば、水分はとっていただいても たん。								
当日(/)	午前時	773048 aut 10g	マグコロール散 100g に水を入れて溶かして飲んでください。 (1袋に水を入れて溶かし、1800mL にして飲んでください。) この時間以降は、食べないでください。								

検査3日前から繊維の多いもの、消化の悪いものは避けてください。

- 例 海藻類、きのこ類、繊維の多い野菜、種のある果物、その他 (ごま、ピーナッツ、こんにゃく)
 - ◎空腹の場合は、準備表の時間に関係なく、水分をできるだけたくさん飲んでください。





マグコロール散を飲む前に、排便状態を確認してください。

検査3日前から排便の状態を記入してください。

◎水様便、軟便 ○普通便(バナナタイプ) △硬便(コロコロタイプ)・少なかった × 出なかった

7	検	査	3 月	日 日)	前	検	査(2 月	日 日)	前	検査前	日(月	検査前日就寝後〜当 日 朝 (月 日	1


※マグコロール散の服用前日または当日に排便のない方は、マグコロール散を服用しないで 医師または看護師に連絡し、指示に従ってください。

マグコロール散の溶かし方・飲み方

水を入れるときは容器の底を十分広げてください。











①キャップを開け、約500mL (500の目盛)の水を入れてください。 ②キャップを閉め、左右に よく振って粉末を十分に 溶かしてください。 ③全量が 1800mL (1800 の目盛) になるまで水を追加してく ださい。

平らな所に置いて 1800 の 目盛まで水が入っているこ とを確認してください。



コップ1杯(約 200mL 程度)ずつゆっくり飲んでください。 *特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。

- ①服用中に次の症状があらわれた場合には、服用を止め医師または看護師にすぐに連絡 してください。
 - 1. 気分が悪い 2. 吐き気がする 3. 吐いた 4. お腹が痛い
 - 5. めまいがする 6. 顔が青ざめる 7. 寒気がする 8. じんましんが出る
 - 9. 息苦しい 10. 意識がぼんやりする 11. 手足に力が入らない
 - 12. 皮ふが赤くなる 13. 脈がおそくなる 14. 血が混ざった便
- ②服用後に同様の症状があらわれた場合にも、すぐに連絡してください。
- ③マグコロール散を服用してから1時間たっても排便がない場合にも、 連絡してください。



- ※下剤服用後、水のような便が数回排泄されます。来院途中で便意を催さないように十分に 排便しておいてください。
- ※排便量が少なかったり、水のような便にならなかった場合には、来院後、受付担当者に申し出てください。