

## 製品別比較表（標準製剤との比較）

	後 発 品	標 準 製 剤		
商 品 名	ジメチコン内用液2%「ホリイ」			
販売会社名	堀井薬品工業株式会社			
規格「一般名」	1mL中「ジメチルポリシロキサン」20mg含有			
薬効分類名	胃内有泡性粘液除去剤			
薬 価	3.0 円／1mL	3.5 円／1mL		
薬 価 差	0.5 円			
効 能 ・ 効 果	腸管内のガスに起因する腹部症状の改善 胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去 腹部X線検査時における腸内ガスの駆除 <div style="text-align: right;">【標準製剤と同じ】</div>			
用 法 ・ 用 量	<b>胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善に使用する場合</b> ジメチルポリシロキサンとして、通常成人1日120～240mgを食後又は食間の3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 <b>胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去に使用する場合</b> 検査15～40分前にジメチルポリシロキサンとして、通常成人40～80mgを約10mLの水とともに経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 <b>腹部X線検査時における腸内ガスの駆除に使用する場合</b> 検査3～4日前よりジメチルポリシロキサンとして、通常成人1日120～240mgを食後又は食間の3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 <div style="text-align: right;">【標準製剤と同じ】</div>			
添 加 物	カルメロースナトリウム、キサンタンガム、モノラウリン酸ソルビタン、含水二酸化ケイ素、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、プロピレングリコール、香料	ポリソルベート、ソルビタン脂肪酸エステル、カルメロースナトリウム、無水ケイ酸、エタノール、パラオキシ安息香酸エチル、ジブチルヒドロキシトルエン、サッカリンナトリウム水和物、香料		
規 制 区 分	—	—		
貯 法	室温保存	室温保存		
使用期限	3年(外箱に表示の使用期限内に使用すること)	3年(外装容器に表示)		
製 剤	商品名	外 観	性 状	識別コード
	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	 300mL (ポリ瓶)	乳白色の不透明な液体で、レモン臭を有する。	
	標準製剤		芳香、甘味を有する白濁液	
安定性試験 *後発品	最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75%、6ヵ月）の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。			
同等性資料	生物学的同等性試験 (該当資料なし)			
連 絡 先	堀井薬品工業株式会社 安全性情報部 TEL:06-6942-3487 FAX:06-6942-1505 〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1-2-6			