



マグコロール散 50g の溶かし方と飲み方

溶かし方

-  ① 大きめのコップに 150mL の水を入れてください。
-  ② スプーンでかき混ぜながらマグコロール散をすべて入れて、十分に溶かしてください。
マグコロール散を水に入れたら放置せず、すぐに溶かしてください。

飲み方

- ひとくちずつ時間をかけてゆっくり服用してください。
- ご高齢の方や胃の切除をされた方は、とくにゆっくり服用してください。
- 服用前後にはできるだけ水分をとってください。
- ひとりでは服用しないでください。
- 氷片を2～3個入れて冷たくすると飲みやすくなります。
- ※飲み始めて約2～10時間後に1回目の排便があります。
(排便には個人差があります。)
- ※服用後は水のような便が数回排泄されます。
- ※排便量が少なかったり、水様便にならなかった場合は、検査の前に申し出てください。

<注意>このような方は連絡してください

- マグコロール散の服用前日と服用前いずれも排便がない方。
(服用しないで連絡してください)
- マグコロール散を全量服用後、排便がない方。
- マグコロール散の服用中または服用後に次の症状があらわれた方。
 - ✓おなかが痛い
 - ✓吐き気がする
 - ✓吐いた
 - ✓血便が出た
 - ✓気分がわるい
 - ✓からだがだるい
 - ✓うとうとする
 - ✓皮膚が赤くなる
 - ✓じんましんが出た など