

製品別比較表（標準製剤との比較）

	後 発 品	標 準 製 剤		
商 品 名	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ガスコンドロップ内用液2%		
販売会社名	堀井薬品工業株式会社			
規格「一般名」	1mL中「ジメチルポリシロキサン」20mg含有			
薬効分類名	胃内有泡性粘液除去剤			
薬 価	3.0 円/1mL	3.4 円/1mL		
薬 価 差	0.4 円			
効 能・効 果	胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善 胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去 腹部X線検査時における腸内ガスの駆除 【標準製剤と同じ】			
用 法・用 量	胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善に使用する場合 ジメチルポリシロキサンとして、通常成人1日120～240mgを食後又は食間の3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去に使用する場合 検査15～40分前にジメチルポリシロキサンとして、通常成人40～80mgを約10mLの水とともに経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 腹部X線検査時における腸内ガスの駆除に使用する場合 検査3～4日前よりジメチルポリシロキサンとして、通常成人1日120～240mgを食後又は食間の3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 【標準製剤と同じ】			
添 加 物	カルメロースナトリウム、キサンタンガム、モノラウリン酸ソルビタン、含水二酸化ケイ素、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、プロピレングリコール、香料	ポリソルベート80、ソルビタン脂肪酸エステル、カルメロースナトリウム、無水ケイ酸、エタノール、パラオキシ安息香酸エチル、ジブチルヒドロキシトルエン、サッカリンナトリウム水和物、香料、グリセリン		
規 制 区 分	—	—		
貯 法	室温保存 3年	室温保存 3年		
製 剤	商品名	外 観	性 状	識別コード
	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	 300mL (ポリ瓶)	乳白色の不透明な液体で、レモン臭を有する。	
	標準製剤		白濁液	
同等性資料	生物学的同等性試験 (該当資料なし)			
連 絡 先	堀井薬品工業株式会社 安全性情報部 TEL:06-6942-3487 FAX:06-6942-1505 〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1-2-6			